

5 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN: Deje de tomar **Aspirina, Ginkgo Biloba o Plavix**. Puede tomar Tylenol. Si tiene un trastorno cardíaco, tuvo un infarto reciente o una colocación de stent coronario, debería analizar esto con su cardiólogo o médico de atención primaria antes de dejar de tomar cualquier agente anticoagulante. Si está tomando anticoagulantes como Coumadin, debería analizar con su cardiólogo o médico de atención primaria cómo administrar sus anticoagulantes y, **SI** debería dejar de tomarlos antes del procedimiento. Sin embargo, si ha tenido una válvula cardíaca mecánica, historial de trombosis venosa profunda en sus piernas, o una embolia pulmonar, es posible que necesite **Lovenox o Heparin** hasta el día del procedimiento. **Por favor llame su gastroenterólogo se no puedes dejar de tomar estos medicamentos**. Si tiene diabetes, siga las instrucciones adjuntas.

1 DÍA ANTES DE SU EXAMEN:

Puede tomar su cena habitual. NO coma ningún alimento sólido después de las 7:00 p.m. A partir de entonces puede continuar Bebiendo únicamente líquidos claros. No beba nada con colorante rojo. ¡Mantenerse Hidratado!

EL DIA DE SU EXAMEN:

¡No debe comer ningún alimento sólido hasta después del procedimiento!

- Si tiene diabetes, controle el nivel de azúcar en sangre antes de venir a su examen y traiga la lectura con usted. Si toma medicamentos orales para la diabetes, no los tome la mañana del procedimiento salvo indicación en contrario de su médico. Si toma insulina, traiga la insulina con usted. Si toma insulina en la mañana, tome sólo la ½ de su dosis habitual.
- Recuerde **TOMAR SUS MEDICAMENTOS HABITUALES** (no anticoagulantes, no antiinflamatorios no esteroideos, no aspirinas, no Plavix) la mañana del procedimiento.
- Se puede tomar poquita agua hasta 4 horas antes de su procedimiento
- Nada por la boca incluyendo: agua, dulce, chicle 4 horas antes del procedimiento. Tomando algo por la boca dentro de 4 horas del procedimiento puede resultar en cancelación o reposición.
- **Madres que amamantan** – Bombe y tire la leche dos veces después del procedimiento antes de retomar el amamantamiento.

OTRA INFORMACION:

- **Venga acompañado al centro de endoscopia para que lo lleven a su casa, ya que estará bajo el efecto de la sedación debido al examen. Usted no debe conducir por 12 horas.**
- Su examen se cancelará o deberá realizarse sin sedación si no tiene a alguien que lo acompañe a su casa.
- Usted estará en el Laboratorio de Endoscopia aproximadamente dos a tres horas. El médico hablará con usted después del examen y le dará recomendaciones para la dieta, medicamentos, cuidados posteriores, etc. Use ropa cómoda; traiga sus lentes, dispositivos auditivos, tarjeta(s) del seguro y formulario de información completo.
- Esperaremos el pago de copagos, coseguros y deducibles en el momento de la atención médica.
- Si su seguro requiere una recomendación, usted debería comunicarse con su médico de atención primaria para coordinar que recibamos la recomendación antes del procedimiento.
- Si tiene que cancelar o reprogramar el procedimiento, usted debe dar aviso 2 días hábiles de antelación. De no hacer lo, dará lugar a una cuota de cancelación de \$100.00.
- **Usted puede recibir CUATRO cuentas por separado por este procedimiento: 1 - Médico, 2 - Instalaciones, 3 – Anestesia, 4 - Patología**

Puede encontrar información adicional en nuestro sitio web www.utahgastro.com.